

Εφαρμογή επιθέματος Καψαικίνης 8%
σε νευροπαθητικό πόνο λόγω συριγγομυελίας


Ε.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
Γ Ν ΞΑΝΘΗΣ

Συριγγομυελία

Ασθενής 41 ετών γυναίκα βάρους 50 kg
με την ανωτέρω διάγνωση από 10ετίας

Η βλάβη εντοπίζεται στο Θ_{6,7,8,9,10}
κεντρικοπλάγια δεξιά

Ο πόνος εμφανίζεται πριν από τρία
χρόνια στη δεξιά οπίσθια θωρακική χώρα



Νευροπαθητικός πόνος

Χαρακτηριστικά

Κάψιμο, ηλεκτρικό ρεύμα, βελονιές και
τσιμπήματα, μούδιασμα, φαγούρα υπαισθησία
αφής και νύξης
απώλεια θερμού-ψυχρού

7/10 βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο DN4

Ποιότητα ζωής 30/100

αγωγή

γκαμπαπεντίνη 150mg ×2
τραμαδόλη 50 mg ×4

πενιχρά αποτελέσματα

Εφαρμογή επιθέματος καψαικίνης 8% στη
χαρτογραφηθείσα περιοχή

Η βελτίωση είναι θεαματική στην εβδομάδα
διέκοψε την προηγούμενη αγωγή

Η δεύτερη εφαρμογή του επιθέματος έγινε με
πόνο 0-2 σε τρεις μήνες χωρίς να είναι
απαραίτητη

Η ασθενής ένα χρόνο αργότερα είναι χωρίς πόνο
και δεν παίρνει καμία αγωγή

συμπέρασμα

Η συριγγομυελία είναι βλάβη στο ΝΜ προκαλεί
νευροπαθητικό πόνο
κεντρικής αιτιολογίας

ερμηνεία του χρόνιου πόνου

Το συρίγγιο που δημιουργείται στο ΝΜ
μεγαλώνει αθροίζοντας εγκεφαλονωτιαίο υγρό¹
πιέζει τις αισθητικές οδούς
προκαλώντας χρόνιο πόνο και διάφορες
αισθητικές διαταραχές

συμπέρασμα

στην ασθενή είχε αναπτυχθεί νευροπαθητικός πόνος ο οποίος αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με το επίθεμα